

Bijsluiter Apcalis & Bijwerkingen Apcalis

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. •Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

•Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker

In deze bijsluiter: 1. Wat is APCALIS en waarvoor wordt het gebruikt?

2. Wat u moet weten voordat u APCALIS inneemt.

3. Hoe wordt APCALIS ingenomen?

4. Mogelijke bijwerkingen

5. Hoe bewaart u APCALIS?

6. Aanvullende informatie

WAT IS APCALIS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? APCALIS

behoort tot de groep medicijnen onder de naam “fosfodiësterase-type 5-remmers”. Het middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele opwinding. U zult met APCALIS alleen een erectie krijgen wanneer u seksueel geprikkeld wordt. APCALIS dient niet door vrouwen te worden gebruikt. APCALIS wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met erectiestoornissen, soms ook wel impotentie genoemd. Dat is wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen of in stand kan houden voor seksuele activiteit.

WAT U MOET WETEN VOORDAT U APCALIS INNEEMT

Neem APCALIS niet in

- Als u geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten of stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”). Deze geneesmiddelen worden vaak ter verlichting van angina pectoris of (“pijn op de borst”) gegeven. APCALIS kan een belangrijke toename van de effecten van deze geneesmiddelen veroorzaken. Vertel uw arts dat u deze geneesmiddelen gebruikt. Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker.
- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor sildenafil of voor één van de andere bestanddelen van APCALIS.
- Als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem heeft.
- Als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft.
- Als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa).
- Als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad vanwege non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION)

Apcalis Bijsluiter



Door: <https://www.kopen-kamagra.nl>

Wees extra voorzichtig met APCALISVertel uw arts

- Als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcelkanker), multipel myeloom (beenmergkanker) of een ziekte of misvorming van uw penis heeft. Bij deze aandoeningen dient men extra voorzichtig te zijn wanneer men geneesmiddelen tegen erectiestoornissen neemt.
 - Als u hartproblemen heeft. Uw arts dient in dit geval zorgvuldig te controleren of uw hart de extra belasting van seksuele activiteit aankan.
 - Als u een maagzweer heeft, of een bloedingstoornis (zoals hemofilie).
 - Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met de inname van APCALIS en neem direct contact op met uw arts. U dient APCALIS niet te gebruiken in combinatie met andere behandelingen tegen erectiestoornissen.
- Speciale voorzorgen voor kinderenAPCALIS mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 18 jaar.

Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemenU dient uw arts te vertellen of u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om u een lagere dosis voor te schrijven.

Speciale voorzorgen in combinatie met andere geneesmiddelenVertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

APCALIS tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen “pijn op de borst”. Bij een medisch noodgeval dient u degene die u behandelt te vertellen dat u APCALIS gebruikt heeft. Gebruik APCALIS niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan. APCALIS kan een belangrijke toename veroorzaken van de werking van geneesmiddelen zoals nitraten en stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”). Deze worden vaak gebruikt ter verlichting van angina pectoris of (“pijn op de borst”). U mag GEEN APCALIS nemen als u deze geneesmiddelen gebruikt.

Wanneer u proteaseremmers gebruikt, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw dokter u laten beginnen met de laagste dosis APCALIS.

Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of prostaatproblemen kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden bij het gaan staan. Dit zijn symptomen van orthostatistische hypotensie hetgeen lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan betekent. Bepaalde patiënten hebben deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van APCALIS met alfablokkers. De kans hierop is het grootst binnen 4 uur na inname van APCALIS. Om de waarschijnlijkheid dat deze symptomen zich voordoen te verkleinen, dient uw dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u

Apcalis Bijsluiter



Door: <https://www.kopen-kamagra.nl>

met het gebruik van APCALIS begint. Mogelijk zal uw arts u een startdosering van 20 mg APCALIS voorschrijven.

Gebruik van APCALIS met voedsel en drank Wanneer APCALIS met voedsel wordt ingenomen, kan het iets langer duren voordat APCALIS gaat werken.

Zwangerschap en borstvoeding APCALIS is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines APCALIS kan duizeligheid veroorzaken en kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U dient zich ervan bewust te zijn hoe u op APCALIS reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van APCALIS Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers, zoals lactose, niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u APCALIS inneemt.

HOE WORDT APCALIS INGENOMEN?

U neemt APCALIS ongeveer één uur voorafgaande aan seksuele activiteit. Slik het tablet in zijn geheel door met wat water. Als u de indruk heeft dat de werking van APCALIS te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in. APCALIS helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden wordt. De tijd totdat APCALIS gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot een uur. Het kan langer duren voordat APCALIS begint te werken wanneer u een zware maaltijd heeft genuttigd. Het drinken van alcohol kan tijdelijk de mogelijkheid om een erectie te krijgen verminderen. Voor een maximaal effect van dit geneesmiddel, wordt u geadviseerd om geen grote hoeveelheden alcohol te drinken voordat u APCALIS inneemt.

Wanneer APCALIS u niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoeg aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen.

Neem APCALIS niet meer dan éénmaal per dag.

Wat u moet doen als u meer van APCALIS heeft ingenomen dan u zou mogen:

Doseringen boven 100 mg geven geen toename van de werking. Het aantal bijwerkingen neemt echter wel toe en ze kunnen ook ernstiger zijn.

U dient niet meer tabletten in te nemen dan uw arts u heeft gezegd.

Neem contact op met uw arts als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

Apcalis Bijsluiter

Door: <https://www.kopen-kamagra.nl>



MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan APCALIS bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Deze zijn meestal licht tot matig ernstig. In gecontroleerde klinische studies waren de meest voorkomende bijwerkingen hoofdpijn of blozen en minder frequent een ontregelde spijsvertering, duizeligheid, een verstopte neus, bonkende hartslag of effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het kleurenzien, verhoogde gevoeligheid voor licht of onscherp zien). Als u een dergelijke erectie heeft, die langer dan 6 uur duurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw dokter. Wanneer u pijn op de borst heeft tijdens of na seksuele activiteit mag u geen nitraten gebruiken, maar dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. Spierpijn kan voorkomen als APCALIS vaker dan eens per dag wordt gebruikt. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

HOE BEWAART U APCALIS?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 30 graden. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Gebruik APCALIS niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blister. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.